

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата
для медицинского применения
ВАЛЕМИДИН®

Регистрационный номер: ЛСР-000057

Торговое название препарата: ВАЛЕМИДИН®

Лекарственная форма: капли для приема внутрь спиртовые

Состав на	25 мл	50 мл	100 мл
Настойки валерианы	8.3 мл	16.6 мл	33.2 мл
Настойки пустырника	8.3 мл	16.6 мл	33.2 мл
Настойки боярышника	4.2 мл	8.4 мл	16.8 мл
Настойки мяты перечной	4.2 мл	8.4 мл	16.8 мл
Димедрола	0.025 г	0.05 г	0.1 г

Описание

Прозрачная жидкость желто-бурого или зеленоватого цвета с характерным запахом.

При хранении допускается помутнение с последующим выпадением естественного осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Седативное средство

Код АТХ: N05CM

Фармакологические свойства

Препарат обладает седативным, а также спазмолитическим действием.

Показания к применению

Препарат применяется у взрослых при неврозах, нейро-циркуляторной дистонии по гипертоническому типу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженные нарушения функции почек и печени, артериальная гипотония, уменьшение частоты сердечных сокращений (менее 55 ударов в минуту), острая и хроническая сердечная недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Способ применения и дозы

Препарат применяется внутрь у взрослых по 30-40 капель 3 – 4 раза в день, предварительно разведенных в небольшом количестве воды, за 30 минут до еды. Курс лечения составляет



10 – 15 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача, но не ранее, чем через 1 – 1,5 месяца.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно развитие диспептических расстройств; при длительном применении – развитие сухости слизистых оболочек ротовой полости.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении «Валемидина» с препаратами, угнетающими деятельность центральной нервной системы (седативные, снотворные средства, транквилизаторы, нейролептики) возможно взаимное усиление эффектов.

Особые указания

Препарат содержит димедрол и этанол, поэтому при применении «Валемидина» следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь спиртовые по 25 мл, 50 мл или 100 мл во флаконы оранжевого стекла или во флаконы-капельницы. Каждый флакон или флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

ООО «Фармамед»

194292, Россия, Санкт-Петербург,

5-й Верхний пер., 19 А, тел. (812) 647 02 46

сайт: фармамед.рф

